



MANUAL CURSO PRIMEROS AUXILIOS BASICOS Y RCP

INSTRUCTORES:
Tte. Cnel. Felipe Scheker
Capitán Synthia Pons
Capitán Luis Díaz

Noviembre, 2009.

Indice.

TEMA	PAGINA
Emergencia-Urgencias- Primeros Auxilios	3
Evaluación de la Escena	3
Protección de Usted y de la Víctima.	4
Movilización de la Víctima.	5
Evaluación de la Víctima.	6
Posición de Salvamento	9
Infartos y Resucitación Cardio-Pulmonar	10
Obstrucción de las Vías Aéreas.	14
Introducción a los desfibriladores externos automáticos (DEA).	17
La llamada de Emergencias.	18
Accidentes Cotidianos	
Alergias	21
Caídas	22
Hemorragias	23
Quemaduras	25
Electrocución.	27
Fracturas	28
Envenenamiento	29
Heridas Oculares	30
Ahogamiento	31

Emergencias Médicas y RCP.

Emergencia Médica: Todo evento súbito que compromete la vida del paciente y que debe ser resuelto de inmediato.

Ej. Paro cardio-respiratorio, atragantamiento.

Urgencia Médica: Evento que debe ser atendido lo mas pronto posible, pero donde no esta comprometida la vida del paciente de manera inmediata.

Ej. Herida, fractura de fémur.

Primeros Auxilios: Son los cuidados inmediatos que se brindan a una persona que resulta herida o súbitamente enferma. No reemplaza la atención médica, sólo consiste en brindar asistencia temporaria hasta que la persona pueda recibir atención médica competente.

EVALUACION DE LA ESCENA.



Esta es una etapa muy importante, tome algo de tiempo para hacer una evaluación de la situación a la que usted deberá enfrentarse. Llame para pedir ayuda o envíe a alguien a llamar.

En caso que existiese fuego o indicios de que hubo fuego en la escena, sea extremadamente cuidadoso y revise si hay presencia de humo o de olores inusuales.

Acción Primaria: Si usted se encuentra en el lugar de una emergencia, tómese unos segundos para estudiar brevemente la situación y considere tres aspectos:

1. Los posibles peligros para usted, la (s) victima (s) o los testigos circunstanciales. Antes de acercarse a la victima, efectúe un examen visual rápido para detectar peligros inmediatos (flujo continuo de tránsito, cables eléctricos, asaltante). Pregúntese siempre si el escenario es seguro.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

2. La impresión de lo que pudo haber pasado. ¿Se trata de una lesión o una enfermedad, es grave o leve?
3. Cuantas personas hay involucradas. Puede haber más de una víctima, así que mire alrededor y pregunte a quienes pudieron haber estado involucrados.

Active el Sistema. Las personas a veces toman decisiones incorrectas con respecto a activar el sistema o llamar al 911. Tal vez tardan en llamar o incluso no lo hacen y trasladan a la víctima gravemente enferma o herida a un centro médico en un vehículo particular cuando hubiese sido mejor en una ambulancia. Piense en sus recursos disponibles y posibilidades!

Acción Secundaria:

- Si es seguro, acérquese a la víctima.
- Permanecer en calma, hablar con voz firme pero sin gritar.
- Pregunte a los observadores si conocen a la víctima y lo ocurrido.
- Pregunte si algún observador tiene entrenamiento en Primeros Auxilios.
- Delegue la responsabilidad a personas que tienen mayor capacidad técnica, en caso de que las mismas estén presentes.

Evite las Sigüientes Acciones

- Permitir que observadores muevan a la víctima, excepto cuando peligre su seguridad y sea peor no moverla.
- Permanecer en el lugar si la víctima está violenta o discute. En este caso llame a la policía o autoridad para que controle esta situación.

Protección Propia y de la Víctima.

Al decidir participar en una emergencia, usted debe evitar convertirse en una víctima más. Protegerse a sí mismo es tan importante como proteger a la víctima.

Reconociendo Peligros Potenciales. Al evaluar los peligros evitaremos aumentar los daños.

- Inestabilidad de estructuras y vehículos.
- Fuego, humo y olores inusuales.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

- Cables eléctricos.
- Tráfico.
- Lesiones posteriores causadas por mover a la víctima.
- Violencia
- Sangre u otros fluidos corporales.

Acciones a Seguir:


- Protéjase de los peligros del lugar. Estudie la escena buscando peligros potenciales. Si las condiciones no son seguras, manténgase a distancia, tranquilice la víctima y active el sistema.
- Proteja a la víctima de futuras lesiones. Determine si hay necesidad de mover a la víctima para sacarla del peligro, de ser necesario utilice una técnica apropiada.
- Protéjase de las responsabilidades legales. Si la víctima esta conciente, infórmele su nombre y su nivel de entrenamiento y obtenga su permiso para que lo pueda ayudar. *No de Primeros Auxilios si la víctima no quiere.* En caso de que la víctima este inconsciente se asume consentimiento implícito.
- Protéjase de posibles enfermedades. Use guantes, fundas plásticas o cualquier cosa como barrera para evitar el contacto con la sangre o fluidos corporales. Lávese las manos lo antes posible una vez haya terminado los primeros auxilios.
- Proteja la espina dorsal de la víctima. Si la víctima tiene o puede tener lesiones en la cabeza, en el cuello o en la espalda, inmovilice la cabeza en línea recta con el cuerpo.

Evite las siguientes acciones:

- Tomar acción sin evaluar los peligros potenciales
- Actuar apresuradamente sin protección de usted y de la víctima
- Mover a la víctima del lugar, exponiéndose a un peligro inmediato
- Entrar a estructuras que se están incendiando
- Comer, beber o manipular lentes de contacto después de trabajar con la víctima sin el debido cuidado.

Movilización de la víctima

Reconocimiento: Mover a la víctima es algo de mucha responsabilidad, realizar una inadecuada maniobra puede ocasionar daños irreversibles a la persona lesionada.



DE

Situaciones donde es apropiado mover la víctima:

- Cuando hay peligro inmediato para la víctima
- Cuando es imposible darle cuidado sin moverla y el no dárselos empeora la situación.
- Si las condiciones del medio ambiente representan un peligro inminente.
- Si moviéndola mejora la aplicación de los primeros auxilios.
- Cuando sea necesario trasladar a la víctima a un centro hospitalario.

Acciones a seguir:

- Comuníquele a la víctima su plan, antes de moverla.
- Si la víctima debe ser movida porque hay peligro, inmovilice el cuello y la espina dorsal en una misma línea. Tome a la víctima por los hombros o los tobillos y aléjela del peligro.
- Si usted debe alzar y llevar a la víctima, consiga ayuda siempre que sea posible
- Si ha de trasladarse a la víctima a un área remota, inmovilice todo el cuerpo.
- Si la condición de la víctima no es de peligro de muerte y usted necesita mover a la persona y tiene ayuda, puede practicar la técnica con otra persona de igual contextura.
- Coloque los brazos de la víctima a los lados del cuerpo en forma recta.
- Use una camilla o improvise una, piense siempre en las lesiones espinales.

Evite las siguientes acciones:

- Mover a la víctima que tiene una lesión espinal, a no ser que sea realmente necesario.
- Mover a la víctima sin tener un plan y sin tener a donde llevarla.
- Mover a la víctima sin asistencia, cuando se puede conseguir un ayudante.

Evaluación de la Víctima:

- Pida ayuda, siempre que sea posible.
- Cálmesese y evalúe sus propias condiciones y estado actual, decida si esta usted en capacidad de ayudar a la víctima.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

- Acérquese a la víctima y hágale con voz controlada, informe que ud. esta entrenado en primeros auxilios y que lo puede ayudar.
- Antes de tocar a la persona, si la víctima esta conciente, pida su consentimiento.
- De ésta no estar conciente, usted debe decidir como actuar.
- Manténgase alerta a los cambios en la situación y en la víctima.

Identificando el Problema.

La vida de un ser humano esta basada en el adecuado funcionamiento de su sistema respiratorio y circulatorio, es por esta razón que la primera atención, sin demora alguna, es verificar lo siguiente:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1 -La capacidad de respuesta | 3-La respiración. |
| 2-La vía aérea | 4 - La presencia de hemorragias |

Verifique la Capacidad de Respuesta.

Si la víctima está conciente y hablando, significa que respira y su corazón late. Pregúntele el nombre y qué pasó. Si la víctima responde entonces está conciente.

Si la victima esta inmóvil, muévela suavemente por los hombros y pregúntele, ¿Está usted bien? Si no hay respuesta, se considera que la víctima está inconsciente y alguien debe llamar al 911 o al número local de emergencias médicas.



Determine si la victima responde: diríjase a ella en un tono de voz lo suficientemente alto para que ella lo oiga. Si no responde sacuda suavemente por los hombros.


Abra la Vía Aérea.

Cuando la víctima esta inconsciente, es preciso abrir la vía aérea para que la víctima respire. Si la víctima está conciente y es capaz de responder preguntas, la vía aérea está abierta. Si una víctima conciente no puede hablar o toser con fuerza, la vía aérea

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

probablemente esté bloqueada y deba ser despejada. Cuando se trata de un adulto o un niño consciente, es posible efectuar compresiones abdominales rápidas (maniobra de Heimlich) para desobstruir la vía aérea, la cual veremos mas adelante.

Si la víctima inconsciente yace boca arriba, abra la vía aérea con la maniobra de inclinar la cabeza hacia atrás y elevar la barbilla, (si no sospecha trauma de cuello), y con la triple maniobra si sospecha lesión en el cuello.



Frente- Mentón.

Triple Maniobra.

Verifique la Respiración.

Mientras realiza la maniobra de la apertura de la vía aérea, verifique la respiración colocando una oreja cerca de la boca de la victima. Mire su pecho para detectar si se eleva y baja, y escuche y sienta para identificar otros signos de respiración normal durante 5-10 segundos.

Si la víctima no respira, debe suministrarle dos respiraciones artificiales iniciales y realizar RCP.



Primeros Auxilios Básicos y RCP.

Verifique si hay Hemorragias Graves.

Esto lo haremos examinando rápidamente todo el cuerpo en busca de sangre, o charcos de sangre en el suelo. Si ve una hemorragia contrólaela presionando sobre la zona.

Cuando haya finalizado el examen inicial y si no encontró nada que pusiera en riesgo la vida de la víctima, realice un examen físico rápido para obtener información sobre el estado actual. Observe y busque deformidad, sensibilidad, heridas e hinchazón.

Posición de Salvamento o de Seguridad.

Si responde o se mueve, se debe dejar en posición en la que se encuentra (siempre que no haya peligro posterior) y buscar que no existen lesiones. Se debe controlar periódicamente.

La posición de seguridad permite la salida de sustancias por la boca y si es necesario coloque la mano debajo de la mejilla para mantener la extensión de la cabeza.



Ajustar la pierna para que forme un ángulo recto tanto con la cadera como con la rodilla. La posición debe ser estable.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

RCP.

Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en los EE. UU y un sistema universal de emergencias (911) es esencial para reducir el tiempo de respuesta a las emergencias y mejorar la supervivencia.

La Cadena de Supervivencia representa la secuencia ideal de acciones que deben realizarse para salvar la vida de una víctima de ataque cardíaco.



Pocas víctimas que sufren un paro cardíaco fuera de un hospital sobreviven, a menos que se siga una rápida sucesión de pasos. Si uno de estos eslabones está roto o no existe, las probabilidades de que la víctima sobreviva disminuyen notablemente.

Si todos los eslabones de la cadena son fuertes, la víctima tiene mayores probabilidades de sobrevivir.

Un *Ataque Cardíaco* se produce cuando muere tejido del músculo cardíaco porque el suministro de sangre se ha reducido notablemente o se ha interrumpido. Si el daño al músculo cardíaco es demasiado grande, el corazón tal vez deje de latir; esta condición se conoce como *Paro Cardíaco*.

Factores de riesgo:

No modificables: herencia, sexo y edad.

Modificables: tabaquismo, hipertensión, colesterol alto, diabetes, falta de actividad física, estrés.

¿COMO RECONOCER UN ATAQUE CARDIACO?

- **Dolor en el centro del pecho**, intenso, de inicio súbito, de tipo opresivo. Puede irradiarse hacia hombros, brazos, cuello, parte superior del abdomen o espalda. Suele durar más de dos minutos.
- El dolor puede acompañarse de **palidez**, **sudoración** fría y pegajosa, **debilidad**, **palpitaciones**, **dificultad para respirar**,

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

náusea, vómito y la **sensación de muerte** o de que algo grave está sucediendo.

- Hay que estar alerta de que el dolor puede no ser muy intenso, la persona puede no verse mal ni tener todos los síntomas; esto es frecuente en ancianos y pacientes diabéticos.
- Usualmente las punzadas agudas y de breves segundos de duración no son síntomas de un ataque al corazón. Hay que diferenciar el infarto de otra condición conocida como “angina de pecho”, en la que el trastorno es reversible, y en el infarto no. La angina de pecho ocurre cuando el estrechamiento de la arteria impide en forma temporal el riego sanguíneo adecuado para el corazón. Una vez que se recupera la circulación o disminuyen las demandas metabólicas del miocardio (como, por ejemplo, una vez que se detiene el ejercicio intenso y se descansa) el dolor desaparece y no ocurre daño permanente en ninguna parte del corazón.

Si usted está presenciando que alguien tiene señales de alarma de un infarto debe inmediatamente llevar a cabo las siguientes acciones:

- **Reconocer** los signos y síntomas de infarto que tiene la persona
- **Reposo** - Suspender inmediatamente la actividad física del paciente
- **Recostar** - Sentar o acostar a la víctima, permitiendo que tome la posición más cómoda para él o ella.
- **Tranquilizar** a la víctima.
- **Activar el sistema médico de urgencias inmediatamente.**
- **Trasladar** a la víctima a un hospital.

Paciente adulto. Paciente adolescente o adulto (A partir de la aparición de caracteres sexuales secundarios) Esto equivale aproximadamente a pacientes mayores de 12 años.



Primeros Auxilios Básicos y RCP.


Paciente pediátrico. Desde el año de edad hasta *antes* de la aparición de los caracteres sexuales secundarios. Esto es aproximadamente a pacientes entre 1 y 12 años



Paciente bebé o lactante Desde el nacimiento hasta el año de edad.




Verifique la Capacidad de Respuesta.



Cuando el lugar sea seguro, verifique si la víctima responde, moviéndola suavemente por los hombros y preguntándole si está bien. Si la víctima no responde, pida a alguien que llame al 911 o active su sistema interno.

Si está solo con un adulto y hay un teléfono cerca active usted mismo el sistema. Si está solo con un niño o lactante inconsciente adminístrele 5 ciclos de RCP (2 minutos) y luego active el sistema.

Abra la Vía Aérea.



Coloque a la víctima boca arriba sobre una superficie rígida. Antes de iniciar RCP, abra la vía aérea inclinando la cabeza de la víctima hacia atrás y levante la barbilla, esto hará que la lengua se separe de la pared posterior de la garganta.


Verifique si la respiración es normal, acercándose a la víctima para detectar si el pecho sube y baja.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

Respiraciones de Rescate.

Si la víctima no respira, debe administrarle respiraciones de rescate. Comprima la nariz con el índice y el pulgar y apoye su boca sobre la boca de la víctima formando un sello hermético. Administre una respiración de 1 segundo, respire usted normalmente y luego suministre otra respiración, verificando en cada una que el tórax se levante. La respiración puede ser:

- Boca - boca
- Boca - dispositivo de barrera
- Boca – nariz
- Boca – estoma



Compresiones Torácicas.


Las compresiones torácicas movilizan una cantidad mínima de sangre hacia el corazón y cerebro. Efectúela con las dos manos si es un adulto, con una o dos manos si se trata de un niño y con dos dedos en un lactante.

Para que las compresiones sean efectivas el reanimador debe presionar con fuerza y rápido.

El tórax de un adulto debe deprimirse de 3.5 a 5 cm. Y el de un niño o lactante, de un tercio a la mitad de su profundidad. El lugar ideal para las compresiones de un adulto y niño es el centro de pecho, entre los pezones; para los lactantes, es justo por debajo de la línea imaginaria que une ambos pezones.

Realice 30 compresiones a una frecuencia de 100 por minuto a adultos, niños y lactantes; tras 30 compresiones, administre dos respiraciones de rescate. Repita los ciclos de 30 compresiones- 2 ventilaciones 5 veces.


Continúe los ciclos hasta que llegue el desfibrilador, el personal del servicio médico de emergencias, que el paciente responda o hasta que usted este muy cansado para continuar.



Primeros Auxilios Básicos y RCP.

OBSTRUCCION DE LAS VIAS AEREAS.

Una obstrucción de la vía aérea ocurre cuando un objeto impide el acceso de aire obstruyendo la vía respiratoria, causando que la persona no pueda respirar adecuadamente.



La mayoría de los casos de atragantamiento en adultos ocurren al comer, por lo que medidas de prevención en este aspecto reducirían la incidencia de este tipo de casos.

Las muertes por asfixia que no son provocadas por alimentos a menudo son causadas por globos, bolas y canicas, juguetes y monedas tragados por niños y lactantes. De nuevo debemos poner énfasis en la prevención. En todos los casos de obstrucción de la vía respiratoria, la víctima suele asumir una posición instintiva: llevarse las manos al cuello (signo universal de asfixia), lo cual indica que requiere ayuda inmediata.

Obstrucción leve de vías aéreas (adultos y niños):

Una obstrucción leve de la vía aérea puede permitirle a la persona tener intercambio de aire en forma adecuada para poder oxigenar la sangre. Esto se manifiesta porque la persona tose con fuerza, puede hablar y puede inhalar y exhalar cantidades suficientes de aire, sin dificultar para respirar.

En el caso de una obstrucción leve de vías aéreas, lo que debe hacer usted es lo siguiente:

1. Estimule a la persona para que tosa fuertemente.
2. No administre golpes en la espalda ni haga maniobra de Heimlich. ¡NO INTERFIERA!
3. No permita que la persona se aleje o se quede sola. Acompáñela si se aleja.

Obstrucción grave de vías aéreas, paciente consciente (*adultos y niños*). Una obstrucción grave de la vía aérea está presente si se observan los siguientes signos: mala entrada de aire y aumento de la dificultad para respirar, tos silenciosa, cianosis o incapacidad de hablar o respirar.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

1. Pregunte directamente y de frente al paciente "¿Se está asfixiando?" Si la víctima asiente, necesita ayuda.
2. Dígale al paciente en voz alta que sabe primeros auxilios y notifíquelo que va a iniciar las medidas necesarias de tratamiento. (*"Sé primeros auxilios. Lo voy a ayudar."*)
3. Colóquese detrás del paciente y aplique compresiones abdominales (Maniobra de Heimlich) continuamente hasta que salga el objeto o hasta que el paciente caiga en inconsciencia.



Estas compresiones se aplican con una mano en forma de puño, cubriéndola con la otra mano y apretando hacia adentro y hacia arriba en un solo movimiento. La posición correcta para

aplicar las compresiones es a la mitad entre el ombligo y el apéndice Xifoides (punta inferior del esternón). En niños los pies no deben dejar de tocar el piso mientras la realiza. Recuerde seguir dando las compresiones hasta que el paciente expulse el objeto o pierda el conocimiento.

En lactantes concientes Sostenga la cabeza y el cuello del lactante y apóyelo boca abajo sobre su antebrazo, luego baje el brazo hasta la pierna. Aplique 5 golpes en la espalda, entre los omoplatos, con el talón de la mano. Gírelo realice 5 compresiones torácicas con dos dedos sobre el esternón, en el mismo lugar que para RCP.



Obstrucción grave de vías aéreas, paciente consciente que cae en inconsciencia (adultos y niños).

1. Recuerde seguir dando las compresiones hasta que el paciente expulse el objeto o pierda el conocimiento.
2. Posicione la persona en el suelo, boca arriba.



Primeros Auxilios Básicos y RCP.

3. PIDA AYUDA

4. Abra la vía aérea (con maniobra frente- mentón)
5. Antes de administrar las respiraciones de rescate debe observar dentro de la boca y quitar cualquier objeto visible.
6. Trate de dar dos respiraciones al paciente. Si el aire no entra es necesario volver a posicionar la cabeza para asegurar que se haya abierto correctamente la vía aérea.
7. **Inicie la RCP**, administrando 30 compresiones torácicas y luego 2 ventilaciones.
8. Recuerde que antes de administrar las respiraciones de rescate debe observar dentro de la boca y quitar cualquier objeto visible.

Obstrucción grave de vías aéreas, paciente inconsciente (adultos y niños).

1. Establezca el estado de consciencia. PIDA AYUDA
2. Posicione la víctima boca arriba
3. Abra la vía aérea (con maniobra frente- mentón)
4. Verifique si la víctima respira (5-10 segundos)
5. Administre dos respiraciones de rescate. Si el aire no entra es necesario volver a posicionar la cabeza para asegurar que se haya abierto correctamente la vía aérea.
6. Inicie RCP, administrando 30 compresiones torácicas y luego 2 ventilaciones.
7. Recuerde que antes de administrar las respiraciones de rescate debe observar dentro de la boca y quitar cualquier objeto visible.
8. En **lactantes inconcientes** inicie RCP. Cada vez que abra la vía aérea verifique si hay un objeto extraño y retírelo.



Asistiéndose usted mismo:

colocar el puño sobre el ombligo, sostenerla con la otra e inclinarse sobre una silla presionando hacia arriba con fuerza.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

INTRODUCCIÓN A LOS DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA).

Un DEA es una máquina con una computadora en su interior. Un DEA puede:

- ❖ Reconocer determinados problemas cardiacos que requieran una descarga eléctrica.
- ❖ Indicarle al reanimador el momento en el que se necesita la descarga
- ❖ Administrar una descarga, si es necesario.

Los DEA son muy precisos y fáciles de usar. Después de un entrenamiento breve, la mayoría es capaz de utilizar un DEA. Si usted empieza la RCP de forma inmediata y utiliza el DEA a los pocos minutos, tiene más probabilidades de salvar la vida de una persona cuyo corazón se ha parado.



Desfibrilador externo automático (DEA).

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

PASOS PARA UTILIZAR EL DEA.

Los pasos para utilizar el DEA son cuatro:

Paso	Acción
1	Encienda el DEA. Siga las indicaciones visuales y verbales.
2	Conecte los parches.
3	Permita que el DEA verifique el ritmo cardiaco de la víctima.
4	Presione el botón shock (descarga), si el DEA lo indica.

LA LLAMADA DE EMERGENCIAS.

Algunas veces será necesario llamar al número local de emergencias médicas (911), para pedir ayuda. Tenga los números de emergencias cerca del teléfono e incluya el número de la policía, bomberos, hospital más cercano a su localidad.

Razones para llamar para pedir ayuda. Debe solicitar ayuda siempre que:

- Alguien tenga lesiones o heridas graves.
- Usted no esté seguro de qué hacer en una emergencia.

Recuerde: Siempre es preferible llamar para solicitar ayuda aunque puede que no la necesite que no llamar cuando alguien necesite ayuda.

Cuando llame al número de emergencias para pedir ayuda el operador le hará algunas preguntas sobre la emergencia. Debe mantener la comunicación hasta que el operador le diga que puede cerrar el teléfono ya que éste puede orientarlo en los pasos a seguir ante la emergencia.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.



NUMEROS DE EMERGENCIAS:

Emergencias:..... 911
Seguridad Interna:.....
Policía Nacional:
Bomberos:
Cruz Roja:.....
Defensa Civil:.....
COE:

Accidentes Cotidianos.


Propósito:

- Conocer las afecciones y accidentes más comunes que se pueden presentar en la vida diaria.
- Listar los Síntomas y Signos de estos.
- Entender los Primeros Auxilios Básicos que se Aplican.
- Saber realizar Inmovilizaciones, Control de Hemorragias y Otros.

Alergias.

Es una manera defensiva del cuerpo de reaccionar contra alergenos. Una víctima puede ser expuesta a alergenos a través del contacto con la piel, picaduras de insectos, inhalación de gases e ingestión.

Las reacciones alérgicas pueden variar en su nivel de severidad. En casos severos una reacción alérgica puede causar la muerte a los pocos minutos de haberse iniciado.



Signos y Síntomas:

- Picazón.
- Salpullido, ronchas.
- Dolores de las articulaciones y/o de estómago.
- Hinchazón de la cara, los ojos, los labios, la lengua, la garganta, etc.
- Mareos, vómitos.
- Color rojizo y calor y/o escalofríos.
- Miedo.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

PAB para Alergias:

- Calme y Tranquilice a la Víctima.
- Aplique compresas frías o loción Calamina.
- Si la Alergia es de una picadura de insecto, no apriete la picada, podría liberar más veneno.
- Verifique el nivel de conciencia, abra la vía aérea, verifique si respira. Si la víctima pierde consciencia, puede ser necesario comenzar RCP.

Caídas.

Una de las consideraciones cuando se sospecha de un accidente por caída, son los daños a la cabeza y/o la columna. Por esta razón la víctima no se debe mover y es sumamente importante tener en cuenta que una víctima de una caída puede haber sufrido fracturas y/o heridas como resultado del accidente. La víctima debe ser supervisada por 24 horas, pues los síntomas y signos pueden aparecer varias horas después.

Signos y síntomas:


- Trauma.
- Dolor severo de cabeza/ espalda.
- Vómitos.
- Confusión, inhabilidad para ubicarse.
- Cambios de personalidad, inconsciencia.
- Dificultades del habla, respiraciones cortas y superficiales.
- Convulsiones.
- Sed, parálisis, frío.

PAB para Caídas.

- Verifique el estado de conciencia, abra vía aérea, verifique si respira y si hay sangrado importante.
- Llame para pedir Ayuda.
- Mantenga a la víctima en la posición en que la encontró. (a no ser que no esté respirando)
- Trate las heridas si están sangrando.
- Asegure que esté respirando y mantenga la vía aérea abierta, especialmente si está vomitando o sangrando por la boca.
- Cubra a la víctima y manténgala cómoda.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

Si la víctima se encuentra en peligro y es necesario girarla, se debe hacer como una unidad, o sea soportando la cabeza, las piernas y la columna.



Las Hemorragias.

Las hemorragias pueden poner en riesgo la vida de la víctima, es importante lograr detenerlas con la mayor rapidez posible. Una pérdida rápida de sangre puede llevar a un shock y la muerte. Las hemorragias pueden ser externas e internas.

Hemorragia Externa Leve:

- La hemorragia es visible
- Colóquese elementos de protección.
- Exponga y vea la herida.
- Limpie la herida con agua y jabón.
- Coloque una gasa esterilizada sobre la herida o un sustituto limpio.
- Levante la herida sobre el nivel del corazón.
- Inmovilice la extremidad en la cual se encuentra la herida.

Hemorragia Externa Grave:

- Llame al Servicio Médico de Emergencia.
- Colóquese elementos de protección.
- No remueva los elementos punzo penetrantes.
- Coloque una gasa esterilizada sobre la herida y haga presión.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.


- Haga presión sobre la arteria femoral o braquial según sea el caso.
- Levante la herida sobre el nivel del corazón.



Aplique presión directa sobre la herida con apósito





Aplique un apósito más si es necesario



Sostenga el apósito con un vendaje compresivo



Técnica de Elevación y Presión Indirecta sobre la Arteria:



Síntomas y Signos de las Hemorragias Internas

- La hemorragia no es visible.
- Pulso rápido.
- Piel fría y húmeda.
- Pupilas dilatadas.
- Paciente refiere sed.

Posición de Shock.

- Colocar a la víctima en posición de shock
- Mantener a la persona cómoda y cálida
- Voltrear la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesión del cuello



PAB Para Hemorragias Internas

- Llame al Servicio Médico de Emergencia
- Verifique el nivel de conciencia, abra la vía aérea, verifique si respira. Si la víctima pierde consciencia, puede ser necesario comenzar RCP.

Quemaduras.

Las quemaduras se pueden clasificar en solares, químicas, eléctricas y por fuego. Las actividades al aire libre nos exponen constantemente al sol por lo tanto las quemaduras solares son las más comunes en estas actividades.


Las quemaduras se evalúan según el grado de afección que tienen los tejidos:

Las de *Primer grado* son las que afectan a la capa exterior de la piel.

Las de *Segundo grado* se extienden por la capa exterior y penetran en la capa interior.

Las de *Tercer grado* son las más graves y se extienden a través de todas las capas de la piel y en otros tejidos como son los tejidos adiposos, músculos y huesos.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.



PAB - Quemaduras de Primer Grado

- Aplique agua fría.
- Cubra con una gasa esterilizada.

PAB - Quemaduras de 2° Grado

- Mantenga el área afectada sumergida en agua.
- Seque la herida con algún elemento esterilizado.
- Traslade o llame al Servicio Médico de Emergencia.

PAB - Quemaduras de 3° Grado

- Cubra la herida con elementos esterilizados.
- Controle el nivel de conciencia, abra la vía aérea, verifique si respira. Si la víctima pierde conciencia, puede ser necesario comenzar RCP.
- Traslade o llame al Servicio Médico de Emergencia.

Evite las Siguietes Acciones:

- Aplicar manteca, margarina, mantequilla o aceites comestibles y salsa de tomate.
- Abrir las ampollas.
- Remover los tejidos.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

- Remover la ropa quemada que esta pegada a la herida.
- Aplicar hielo.

PAB - Quemaduras Químicas

- Utilizar protección, si es posible facial.
- Lavar con abundante agua.
- Remueva la ropa, reloj y joyas.
- Traslade o llame al Servicio Médico de Emergencia.

Quemaduras Eléctricas o Electrocuación

Las Exposiciones a choques eléctricos pueden causar lesiones y daños graves, pueden perturbar el ritmo cardíaco, causar un paro cardíaco, quemaduras y otras lesiones.

La Electrocuación es uno de los rescates más peligrosos para el rescatador, debido a la presencia de la corriente eléctrica. Si sospecha que la víctima está recibiendo electricidad de alto voltaje no se le acerque, pues la electricidad puede hacer un arco desde la víctima hasta usted. Mantenga una distancia de 7-8 metros /20-25 pies.

PAB - Quemaduras Eléctricas

- Evalúe el accidente.
- Interrumpa o desconecte la corriente.
- No toque los cables ni la víctima.
- Acérquese cuando no hayan riesgos.
- Utilice algún elemento no conductor para tocar al accidentado.
- Controle el nivel de conciencia, abra la vía aérea, verifique si respira. Si la víctima esta inconsciente, puede ser necesario comenzar RCP.
- Traslade o llame al Servicio Médico de Emergencia.

Síntomas y Signos de Electrocuación

- Quemaduras donde “entró y salió” la electricidad, olor de ropa o piel quemada.
- Dolor de cabeza, músculos o extremidades, mareo.
- Sentido de haber sido sacudido severamente, fatiga.
- Falta de respiración.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

Evite Las Sigüientes Acciones:

Mover a la víctima a no ser necesario para salvar su vida o protegerse.

Acercarse a la víctima antes de interrumpir la fuente de energía eléctrica

Fracturas.

Las fracturas ocurren cuando el hueso sufre una presión mayor de lo que puede soportar y se fractura. Puede suceder como resultado de un golpe o trauma.

Clasificación:

- Fractura Simple
 - Solo se observa una deformación.

- Fractura Expuesta o Compuesta
 - El hueso rompe la piel.
 - El hueso puede ser fracturado o completamente roto y penetrar la piel.

- Dislocación.
 - El hueso es sacado de su lugar. Cuando esto ocurre, casi siempre los ligamentos son desgarrados.

Signos y síntomas de las Fracturas.

- Dolor Concentrado en el área específica donde fue golpeada.
- Hinchazón y deformación.
- Hueso penetrando la piel.

PAB Fracturas.

- Llame para pedir ayuda.
- Verifique el nivel de conciencia, abra la vía aérea, verifique si respira. Si es necesario comience con RCP.
- Inmovilice el área en la cual se sospecha la existencia de una fractura.
- Inmovilizar o entablillar la fractura.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.



Para entablillar, recuerde que puede usar cualquier elemento que no se deforme, ajustándolo con la ropa o un pedazo de ésta.

Cualquier movimiento innecesario puede aumentar la gravedad de la lesión.

También se puede inmovilizar una pierna fracturada atándola a la pierna no lesionada. Cartones duros, listones de madera, son algunos de los elementos que se pueden usar para inmovilizar.

Evite Las Sigüientes Acciones

- Mover a la víctima antes que la herida sea inmovilizada.
- Tratar de estirar el hueso o las articulaciones.
- Dar de comer o de beber a la víctima.

Envenenamiento.

Los Venenos pueden ser introducidos al cuerpo a través de ingestión (comida), inhalación (gases), plantas, picaduras de insectos o mordeduras de animales venenosos.

Por lo general los productos tóxicos tienen en el envase un número de teléfono para emergencias.

Síntomas y Signos de Envenenamiento

- Olor a sustancias químicas.
- Escalofríos o fiebre.
- Mareos, debilidad, dolor de cabeza.
- Dolor de estomago, diarrea, vómitos.
- Dolor en el pecho, palpitations del corazón, dolor en la garganta.
- Hinchazón de cara, labios, lengua.
- Dificultades respiratorias y/o del habla.
- Pérdida de coordinación, doble visión, inconsciencia.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

PAB Envenenamiento

- Llame para pedir ayuda.
- Calme a la víctima.
- Trate de identificar el veneno. Pregúntele a la víctima. Guarde muestras del veneno.
- En caso de que la víctima vomite, guarde y lleve el vomito con la víctima a la facilidad médica más cercana.
- Verifique el nivel de conciencia, abra la vía aérea, verifique si respira. Si es necesario comience con RCP, prestando atención especial a la vía aérea si la víctima está vomitando.

Evite Las Sigüientes Acciones:

- Forzar a la víctima a vomitar (a no ser instruido por un Médico)
- Dar ningún antídoto (a no ser instruido por un Médico)
- Tratar de neutralizar el veneno con jarabes caseros o con vinagre, limón o leche (a no ser instruido por el Médico)

Envenenamiento por Picaduras de Animales

- No aplique torniquete. No eleve el área de la picada más arriba del corazón de la víctima.
- No permita que la víctima se agite o realice cualquier actividad que acelere el ritmo cardíaco.

Heridas Oculares.

Los ojos de por sí, son muy delicados y complejos. Las heridas a los ojos, merecen una atención especial para no causar daños mayores, los cuales pueden resultar en pérdida parcial o completa de la vista de la víctima.

Signos y síntomas de heridas oculares.

- Arañazos, golpes, ojos rojizos.
- Dolor en o alrededor del ojo.
- Lagrimeo, dolor cuando se dirigen a la luz.
- Visión limitada, dolor de cabeza.
- Pupilas de distintos tamaños o no responden a la luz.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

PAB Heridas Oculares.

- Llame para pedir ayuda.
- Lave sus manos con jabón antiséptico antes de tocar el área herida o el ojo.
- Si dentro del ojo hay alguna materia como polvo, enjuague el ojo con agua abundante.

Si no puede sacar el objeto al enjuagar con agua limpia, si el objeto esta penetrando el ojo o si ha experimentado una quemadura (por fuego o química) y al enjuagar no se alivia, es necesario que ambos ojos, aunque solo uno haya sufrido la herida, sean cubiertos cuidadosamente con un vendaje limpio (no con algodón; este puede irritar más la herida) y trasladar a la víctima a un Médico o a un Hospital.

El cubrir ambos ojos previene que la víctima mueva ambos ojos y cause mayores daños.

Evite Las Siguietes Acciones

- Que la víctima se restriegue el ojo.
- Remover objetos penetrados en el ojo.
- Utilizar instrumentos metálicos cerca del ojo. (la víctima puede moverse)
- Usar materiales (como un trapo) para sacar partículas que estén dentro del ojo.

Ahogamiento.

Es muy común pensar que las personas se ahogan por tener agua en los pulmones. Sin embargo, si recordamos lo que aprendimos anteriormente, la razón por la cual un ser humano se ahoga es debido a la falta de oxígeno. Como discutimos anteriormente, el sistema circulatorio tiene que obtener, procesar y llevar oxígeno al cerebro para sostener la vida.

Síntomas y Signos de una Víctima de Ahogamiento

- ❖ Pánico en la superficie.
- ❖ No poder gritar ni pedir ayuda, mientras se hunde desesperadamente.
- ❖ Color azul en la piel, los labios y orejas.
- ❖ Piel pálida y fría.
- ❖ No respira.

Primeros Auxilios Básicos y RCP.

PAB Ahogamiento.

- ❖ Llame para pedir ayuda.
- ❖ Saque a la víctima del agua.
- ❖ Verifique el nivel de conciencia, abra la vía aérea, verifique si respira. Si es necesario comience con RCP.
- ❖ Si no ve heridas, y la víctima esta respirando y tiene pulso, ponga a la víctima boca abajo.
- ❖ Si esta respirando quítele las ropas frías y mojadas y cúbralo para normalizar la temperatura.
- ❖ Si la víctima escupe agua o tiene dificultad respirando, anímelo a que continúe respirando hasta que llegue la ayuda.

Aunque la víctima de un casi ahogamiento, se recupere y se sienta bien, es necesario que esta persona reciba atención médica lo antes posible. Pues siempre es posible que experimente un “ahogamiento secundario”. Si la víctima no quiere cooperar, hable con la familia o algún amigo de la víctima y explíquelo la importancia de su recomendación

NOTAS: _____
